



سوالات استخدامی پرستاری

میهن استخدام ارائه کننده بهترین سوالات و جزوات استخدامی در سراسر کشور

میهن استخدام



WWW.MIHAN-ESTEKHDAM.IR



MIHAN.ESTEKHDAM



09112941994

پاسخ تستی، تشریحی

کدام مورد در نوزاد، طبیعی محسوب می شود؟

(۱) دفع مکنونیوم طی زایمان

(۲) دفع ادرار ۲۰-۳۰ بار در روز

(۳) قلیایی بودن ترشحات معده

(۴) حجم خون ۱۰۰-۱۲۰ cc به ازای هر کیلو وزن

مادر به عنوان مشاور به شما اظهار می داد طفل سه ساله اش دچار کج خلقی شده است.

توصیه شما کدام مورد زیر است؟

(الف) به کودک بگویید رفتارش صحیح نیست.

(ب) توجه کودک را به چیزهای دیگر جلب کنید.

(ج) با رفتار کودک مانند خودش مقابله کنید.

(د) رفتار کودک را به مدت چند دقیقه نادیده بگیرید.

(د) شروع تلاش کودک برای جدا شدن از مادر و کسب استقلال خصوصیات لجبازی و

منفی گرایی را در او ایجاد می کند. ممکن است کودک در مقابل محدود شدن رفتارش دست به

اعتراض شدید بزند. باید به کودک نوپا کمک کند تا عکس العمل های منفی گرایانه او تقلیل یابد

نحوه سؤال کردن در کاهش منفی گرایی مهم است مثلاً بجای اینکه آیا می خواهی بخوابی؟ بگوییم

الان وقت خواب است و حتی الامکان از جملات مثبت استفاده کنند. بهترین روش های تأدیب در

این دوره بی اعتنایی به رفتارهای منفی و محروم کردن است. (R5 ص ۲۴).

به هنگام ترخیص بیمار مبتلا به آندوکاردیت، بر کدام نکته

آموزشی تأکید می کنید؟

(۲) عوارض داروهای ضد انعقاد

(۱) محدود کردن فعالیت ها

(۴) مصرف آنتی بیوتیک پروفیلاکسی

(۳) محدودیت مصرف مایعات

کدام خصوصیت آزمون غربالگری، برای یافتن کلیه افراد مبتلا به بیماری در جامعه در معرض

خطر و درمان زودرس آنها، باید مدنظر قرار گیرد؟

(ب) پایایی

(الف) ویژگی

(د) ارزش اخباری

(ج) حساسیت

(ج) حساسیت: توانایی آزمون در شناسایی صحیح افراد مبتلا به بیماری که آن را «مثبت واقعی»

می نامند. یک تست دارای حساسیت بالا دارای نتایج «منفی کاذب» بسیار کمی دارد. (R1 ص

۲۸۴)

WWW.MIHAN--ESTEKHDAM.IR



در مراقبت های پرستاری بعد از عمل جراحی میلو مننگوسل، کدام صادق است؟

الف) ممنوعیت پوشک کردن تا زمان ترمیم محل جراحی

ب) قرار دادن کودک در وضعیت طاقباز

ج) ممنوعیت لمس درمانی تا زمان برقراری تعادل حسی - حرکتی

د) عدم سونداژ کودک به منظور پیشگیری از عفونت

الف) پس از جراحی، وضعیت خوابیده به شکم هم چنان حفظ می شود، در صورت وجود احتباس

ممکن است نیاز به سونداژ باشد، بررسی های پرستاری جهت کاربرد اقدامات آرام بخش در مرحله

پس از عمل انجام می شود. ممکن است تا زمان اصلاح نقص و بهبود یا اپی تلیالیزه شدن آن از دیپر

کردن شیرخوار خودداری شود. (R1 ص ۳۹۹-۳۹۸)

بعد از تیروئیدکتومی، وجود کدام ست در بالین بیمار ضروری است؟

۱) سنداژ

۲) ترانسنز

۳) تزریق وریدی

۴) تراکیاستومی

اولین قدم برای بیان خبر ناخوشایند مرگ فرزند به والدین کدام است؟

الف) ارزیابی سطح آگاهی والدین

ب) حساس بودن به واکنش والدین

ج) عرضه اطلاعات به زبان قابل درک

د) فراهم سازی موقعیت مناسب

د) اقدامات لازم برای بیان خبر مرگ فرزند به والدین شامل:

- موقعیتی را برای برقراری ارتباط فراهم کنید.

- آنچه را که والدین می خواهند بدانند مشخص کنید.

- اطلاعات را آرایه دهید. (تنظیم کردن و آموزش)

- به واکنش های والدین پاسخ دهید.

- جلسه را خاتمه دهید. (R1 ص ۶۱۷)

در بیمار بیهوش بهترین وضعیت برای کمک به خروجی ترشحات تنفسی کدام است؟

۱) نشسته

۲) نیمه نشسته

۳) به پشت خوابیده

۴) نیمه به شکم خوابیده

WWW.MIHAN--ESTEKHDAM.IR

پرستاری در حال بررسی فیزیکی بیمار دچار بیماری ریوی است. وی دق (Percussion) را برای بررسی کدام موارد زیر انجام می دهد؟

الف) ساختمان ریه و بیرون زدگی دیافگرام

ب) ارزیابی صداهای ریه

ج) پوزیشن تراشه و تندرns توراکس

د) انبساط و لرزش ریوی

الف) دق یکی از مهم ترین روش های معاینه فیزیکی قفسه سینه است و برای تعیین وجود هوا، مایع یا جامد در بافت های زمینه ای و برای تعیین اندازه و موضع ساختمان ها (مثل دیافراگم، قلب، کبد) به کار می رود، دق تنها در حدود ۷-۵ سانتی متر به داخل قفسه سینه نفوذ می کند، لذا در تشخیص ضایعات عمقی کمک نخواهد کرد. صدای طبیعی ریه در دق رزونانس است. برعکس، صدای حاصل از دق ریه متراکم یا افیوژن جنبی، مات است در حالی که در آمفیزم و پنوموتوراکس، هیپررزونانس (پرطنین) می باشد. (R1 ص ۴۵)

رعایت قوانین و مقررات و پیشگیری از رفتارهای تهاجمی در مراقبت از کدام بیماران است؟

۲) شخصیت های ضد اجتماعی

۱) شخصیت های مرزی

۴) شخصیت های اسکیزوئید

۳) شخصیت های وسواسی

در آموزش به مبتلایان به دیابت پرستار احتمال بروز هیپوگلیسمی با کدام دارو را بیشتر تأکید می کند؟

ب) گلی بوراید (Glyburide)

الف) آکاربوز (Acarbose)

د) پیوگلیتازول (Pioglitazone)

ج) متفورمین (Metformin)

الف) آکاربوز از داروهای مهارکننده خوراکی آلفاگلوکوزیداز است که برای درمان یا تب نوع II به کار می رود. این دارو جذب گلوکز از دستگاه گوارش را به تأخیر می اندازد و باعث کاهش غلظت گلوکز خون بعد از غذا می شود و خطر هیپوگلیسمی بیمار را تهدید می کند. (R1 ص ۱۱۳)

بیماران مبتلا به ترسی مرضی کدام مکانیسم دفاعی را بیشتر به کار می برند؟

۲) جابجایی یا انتقال

۱) برترسازی یا تصفیه

۴) واکنش سازی یا واکنش معکوس

۳) فرافکنی یا برون فکنی

WWW.MIHAN--ESTEKHDAM.IR

